









|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |







生长激素      甲状腺激素      肾上腺素      胰高血糖素  
 └──────────┬──────────┬──────────┬──────────┘  
 促进生长发育      提高代谢水平      升高血糖浓度

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |







|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |





| 组别  | 处理方式  | 检测结果          |
|-----|---|---------------|
| 实验组 | 用肺癌细胞抗原处理M细胞后,分离出M细胞与胸腺淋巴细胞混合培养,再分离出胸腺淋巴细胞与肺癌细胞混合培养 | 部分淋巴细胞能杀伤肺癌细胞 |
| 对照组 | 未经处理的胸腺淋巴细胞与肺癌细胞混合培养                                | 淋巴细胞不能杀伤肺癌细胞  |






\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_

| 检测对象 | TSH 浓度(mU/L) |     |
|------|--------------|-----|
|      | 注射前          | 注射后 |
| 健康人  | 9            | 30  |
| 甲    | 2            | 29  |
| 乙    | 1            | 2   |








---



---



---



---







